



galenik
majistral



**FAGRON
FORMÜLASYON
KİTABI**

Fagron
Türkiye Distribütörü

Değerli Doktor ve Eczacımız;

Bu formülasyon kitabı size Avrupa Farmakopesi'nden derlenmiş, akneden hemoride, portherpetik nevraljiden yatak yarasına kadar uzanan geniş yelpazede toplam 23 ayrı teşhiste kullanılan 48 majistral formülü sunmaktadır. Bu seçkin formüller aynı zamanda "Pratik Paket" olarak sağlık sektörünün hizmetindedir.

Hikayemiz

1976 yılında İzmir'de kurucumuz Ecz. Sami ŞEN'in mesleğine duyduğu büyük tutkuyla başlayan hikâyemiz, aradan geçen yarım asırda edindiğimiz sayısız tecrübe, bilgi ve birikim ile bizi majistral ham madde, eczane, laboratuvar ve ambalaj malzemeleri tedarikinde olduğu kadar, majistral ilaç yapımı teşvikinde de Türkiye'nin sorumluluk sahibi kurumlarından biri konumuna getirmiştir.

Eczacılık mesleğinin temelini oluşturan majistral, teknolojinin de ilerlemesiyle başka bir boyut kazanmış ve Amerika, Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkelerde kişiye özel tedavi, hasta uyumu ve hazır müstahzarların yan etkilerinden hastayı korumak gibi anlamlı avantajlarıyla hekimlerin daha sıklıkla tercih ettiği tedavi yöntemleri arasına girmiştir. Ancak ülkemizdeki majistral ilaç yapımı ve teknolojisini dünya standartlarıyla kıyasladığımızda, Türkiye majistral alanının bu standartlara ulaşması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu bağlamda Türkiye majistral alanındaki konum ve sorumluluğumuzu vizyoner bakış açımız ile birleştiriyoruz.

**Galenik Ecza olarak majistral ilaçta yeni dünyayı
Türkiye'ye getiriyoruz.**

Modern majistral dünyasının önde gelen firmalarından biri olan Fagron 'un Türkiye distribütörlüğünü alarak dünya standartlarındaki hizmetlerimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz. Cilt tipine özel baz kremlerden transdermal kremlere, loliop şeklinde ateş düşürücülerden köpük formda majistral ürünlere kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle kişiye özel tedaviyi ön plana alan modern Majistral'i sizlerin ve hastalarımızın hizmetine sunuyoruz.



Fagron, 1990 yılında Rotterdam (Hollanda) 'da kuruldu ve yenilik, kalite ve çözüm odaklı düşünceye önem vererek majistral alanında 7 yıl içinde pazar lideri oldu. Fagron'un başarılı stratejisi, tüm dünyadaki hekimler için tedavi seçeneklerini genişletirken, hastaların yaşam kalitesini artırmış ve Fagron kişiye özel tedaviyi optimize etmeye ve geliştirmeye odaklanmıştır. Benzersiz iş modeli, inovasyon ve ürün geliştirmeye yapılan yatırımlarla Fagron, şu anda Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Pasifik'te toplam 35 ülkede faaliyet göstermekte, ürünlerini 60'ın üzerinde ülkede 200.000'den fazla müşteriye ulaştırılmakta ve majistral alanında liderlik etmektedir.

Fagron kimdir?



Pratik Paketler



Hızlı



Güvenilir



Kolay

Fagron Pratik Paketleri topikal majistral ürünlerin hazırlık gerektirmeden hızlı, güvenilir ve kolay hazırlanmasını sağlar.

Bu pratik paketler eczacılarımıza kişiye özel tedavide çok özel bir yere sahip olan topikal majistral ürünleri hatasız ve güvenli şekilde yapmaları için gereken her imkanı sunmaktadır.

Fagron Pratik Paketlerin Avantajları:

- En yüksek ürün etkinliği ve kişiye özel tedavi imkanlarını bir arada sunar.
- Bir topikal solüsyonun hazırlanabilmesi için gerekli olan etken madde ve çözücüler formülasyona göre önceden tartılmış şekilde içerir.
- Pratik paketlerin içinde yer alan maddeleri sadece ekleyip karıştırarak, hızlı ve kolay majistral ürün yapılmasını sağlar.
- Stabilitate testleri ile desteklendiği için yapılan her ürün her yapılda aynı etkinlik ve formda olacaktır.
- Hazırlanan ürünlerin stabilliği, hastanın tedaviye uyumunu en üst düzeye çıkarmaktadır.
- Stok maliyeti olmadığı için uygun maliyetli, hazırlık süreci gerektirmediği için zaman kazandırıcıdır.

Hatasız ve Güvenli Kişiyeye Özel Tedavi

- Eczacılarımızın, paket içindeki hazırlama kılavuzunu takip ederek, önceden tartılmış hammaddeleri uygun ambalajın içinde kolayca karıştırarak topikal ürünleri hazırlaması sadece birkaç dakika sürer.
- Zamandan tasarruf sağlayan bu paketler hem doktor ve eczacılar hem de hastalar için hata riskini azaltarak kişiye özel tedaviyi yüksek güven düzeyiyle hastalara sunma imkanı sağlar.

Fagron Pratik Paketlerin İçerikleri:

- Önceden tartılmış baz
- Önceden tartılmış etken madde
- Hastaya sunuma hazır ve eczacının ham maddelerin doğrudan içinde karıştırarak ürünü yapacağı ambalaj
- Hazırlama kılavuzu



8-13

Acne (Akne)

- 8 Fagron Advanced Derma Pack BPV
%40'luk Benzoil peroksit jel %25, Versatile™
- 9 Fagron Advanced Derma Pack CTNF
Klindamisin HCl %2, Tretinoin (Retinoik asit) %0.03,
Nikotinamid %4, Fitalite™
- 10 Fagron Advanced Derma Pack EBV
Eritromisin %3, Anhidr benzoil peroksit %10, Versatile™
- 11 Fagron Advanced Derma Pack ETN
Eritromisin %4, Tretinoin (Retinoik asit) %0.03,
Nourivan™ Antiox
- 12 Fagron Advanced Derma Pack GS-NAF
Glikolik asit %3, Salisilik asit %2, Nikotinamid %2,
Fagron aloe vera jel 10x %3, Fitalite™
- 13 Fagron Advanced Derma Pack VNF
Vitamin A %0.4, Nikotinamid %5, Fitalite™

14-20

Alopecia (Alopesi)

- 14 Fagron Advanced Derma Pack LS
Latanoprost %0.005, Seraqua™
- 15 Fagron Advanced Derma Pack MCT
Minoksidil %5, Klobetazol propiyonat %0.05,
TrichoFoam™
- 16 Fagron Advanced Derma Pack MET-A
Minoksidil %5, 17α-estradiol %0.05, TrichoFoam™
- 17 Fagron Advanced Derma Pack MFT
Minoksidil %5, Finasterid %0.1, TrichoFoam™
- 18 Fagron Advanced Derma Pack Dual MLT
Minoksidil %5, Latanoprost %0.005, TrichoFoam™
- 19 Fagron Advanced Derma Pack MTE
Minoksidil %5, Tretinoin (Retinoik asit) %0.05,
Espumil™
- 20 Fagron Advanced Derma Pack PPE
Prostaquinon® %3, Espumil™

21-24

Antiaging (Yaşlanma önleyici)

- 21 Fagron Advanced Derma Pack ANAN
Arjinin HCl %2.5, Nikotinamid %4, Askorbik asit %10,
Nourivan™ Antiox
- 22 Fagron Advanced Derma Pack CNAN
Siyanokobalamin %0.07, Nikotinamid %4,
Askorbik asit %10, Nourivan™ Antiox
- 23 Fagron Advanced Derma Pack RS
Retinol (vit. A) %0.4, Seraqua™
- 24 Fagron Advanced Derma Pack SES
Sodyum hiyalüronat %1, EPIfactor® 1 ml, Seraqua™

25

Atopic dermatitis / Eczema (Atopik dermatit / Egzema)

- 25 Fagron Advanced Derma Pack HYDROCAV
Hidrokortizon asetat %1, Dekspantenol %5,
Siyanokobalamin %0.07, Arjinin HCl %2.5, Versatile™ Rich

26-27

Bed sores (Yatak yarası)

- 26 Fagron Convenience Pack PL
Pentoksifilin %5, Lavare™
- 27 Fagron Advanced Derma Pack PMV
Pentoksifilin %5, Metronidazol %2, Versatile™

28

Hemangiomas (Hemanjiyom)

- 28 Fagron Convenience Pack PROP
Propranolol hidroklorür %1, Pentravan®

29

Hemorrhoids (Hemoroid)

- 29 Fagron Convenience Pack NLP
Nifedipin %0.3, Lidokain %1, Pentravan®

30

Hyperhidrosis (Hiperhidroz)

- 30 Fagron Advanced Derma Pack GBF
Glikopironyum bromür %2, Fitalite™

31-32

Hyperkeratosis (Hiperkeratoz)

- 31 Fagron Advanced Derma Pack 5-FV
5-Fluorourasil %5, Versatile™
- 32 Fagron Advanced Derma Pack SAVU
Salisilik asit %3, Amonyum laktat %10, Üre %15,
Versatile™ Rich

33-34

Hyperpigmentation (Hiperpigmentasyon)

- 33 Fagron Advanced Derma Pack ACA
Arbutin %5, Askorbik asit %1.5, Nourivan™ Antiox
- 34 Fagron Advanced Derma Pack HTTN
Hidrokinon %5, Tretinoin (Retinoik asit) %0.05,
Triamsinolon asetonid %0.01, Nourivan™ Antiox

35 Mycosis feet (Ayak mantarı)

- 35 Fagron Advanced Derma Pack MZV
Mikonazol %2, Hint yağı %5, Peru balsamı %5,
Çinko oksit %10, Versatile™ Rich

36

Nail treatment (Tırnak tedavisi)

- 36 Fagron Convenience Pack CSU
Klobetazol propiyonat %8, Salisilik asit %4, Unabase®

37-38

Onychomycosis (Ayak tırnağı mantarı)

- 37 Fagron Convenience Pack CLU
Klotrimazol %6, Unabase®
38 Fagron Convenience Pack MR
Mikonazol %10, Recura™

39-40

Oral lichen (Oral liken planus)

- 39 Fagron Convenience Pack CO
Klobetazol propiyonat %0.05, Orafix®
40 Fagron Convenience Pack TO
Takrolimus monohidrat %0.1, Orafix®

41

Post laser (Lazer sonrası)

- 41 Fagron Advanced Derma Pack EPV
EPIfactor® 1 ml, Versatile™ Rich

42-43

Postherpetic neuralgia (Postherpetik neuralji)

- 42 Fagron Convenience Pack GKALP
Gabapentin %10, Ketoprofen %5, Amitriptilin HCl %2,
Lidokain HCl %5, Pentravan®
43 Fagron Convenience Pack KLP
Ketoprofen %10, Lidokain HCl %5, Pentravan®

44-46

Psoriasis (Sedef hastalığı)

- 44 Fagron Advanced Derma Pack DCN
Ditranol %1, Kömür katranı çözeltisi %1,
Nourivan™ Antiox
45 Fagron Advanced Derma Pack CZV
Kömür katranı çözeltisi %5, Çinko oksit %5,
Versatile™ Rich
46 Fagron Advanced Derma Pack SRNAV
Şi ağacı yağı %10, Kuşburnu yağı %5, Nikotinamid %2,
Alfa-Tokoferol (E vitamini) %3, Versatile™

47-48

Rosacea (Gül hastalığı)

- 47 Fagron Advanced Derma Pack IF
İvermektin %1, Fitalite™
48 Fagron Advanced Derma Pack PEF
Permetrin %5, Fitalite™

49

Seborrheic dermatitis (Seborrheic dermatitis)

- 49 Fagron Advanced Derma Pack TT
Takrolimus monohidrat %0.1, TrichoSol™

50

Spider veins/ Bruises (Örümcek damar/Morarma)

- 50 Fagron Advanced Derma Pack HF
Heparin sodyum %1, Fitalite™

51

Stretch marks (Deri çatlağı)

- 51 Fagron Advanced Derma Pack ACN
Argan yağı %15, Hint yağı %2, Nourivan™ Antiox

52-53

Topical anesthesia (Topikal anestezi)

- 52 Fagron Advanced Derma Pack BLTV
Mikronize benzokain %20, Lidokain %6, Tetrakain %4,
Versatile™
53 Fagron Advanced Derma Pack LTV
Lidokain %7, Tetrakain %7, Versatile™

54-55

Xerosis (Kserozis)

- 54 Fagron Advanced Derma Pack SANAV
Sodyum hiyalüronat %1, Arjinin HCl %2.5, Nikotinamid %4,
Alfa-Tokoferol (E vitamini) %5, Versatile™
55 Fagron Advanced Derma Pack UNAV
Üre %20, Nikotinamid %2, Alfa-Tokoferol (E vitamini) %5,
Versatile™

Acne (Akne)

Fagron Advanced Derma Pack BPV

%40'lık benzoil peroksit jel %25, Versatile™

Rx

A. %40'lık benzoil peroksit jeli	25 g
B. Versatile™	qs. 100 g

Endikasyon

Inflammatory acne (Enflamasyonlu akne)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa (gece)



Acne (Akne)

Fagron Advanced Derma Pack CTNF

**Klindamisin HCl %2,
Tretinoin (Retinoik asit) %0.03,
Nikotinamid %4, Fitalite™**

Rx

A. Klindamisin HCl	2 g
B. Tretinoin (Retinoik asit)	30 mg
C. Nikotinamid	4 g
D. Fitalite™	qs. 100 g

Endikasyon

Comedonal acne (Komedonal akne)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa (gece)



Acne (Akne)

Fagron Advanced Derma Pack EBV

Eritromisin %3, Sulu benzoil peroksit %10, Versatile™

Rx

A. Eritromisin		3 g
B. Sulu benzoil peroksit		10 g
C. Versatile™	qs.	100 g

Endikasyon

Inflammatory acne (Enflamasyonlu akne) / Akne papulopustulosa

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa (gece)



Acne (Akne)

Fagron Advanced Derma Pack ETN

Eritromisin %4, Tretinoin (Retinoik asit) %0.03, Nourivan™ Antiox

Rx

A. Eritromisin	4 g
B. Tretinoin (Retinoik asit)	30 mg
C. Nourivan™ Antiox	qs. 100 g

Endikasyon

Inflammatory acne (Enflamasyonlu akne)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa (gece)



Acne (Akne)

Fagron Advanced Derma Pack GS-NAF

**Glikolik asit %3, Salisilik asit %2, Nikotinamid %2,
Fagron aloe vera jel 10x %3, Fitalite™**

Rx

A. Glikolik asit	3 g
B. Salisilik asit	2 g
C. Nikotinamid	2 g
D. Fagron aloe vera jel 10x	3 g
E. Fitalite™	qs. 100 g

Endikasyon

Acne (idame tedavi)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Acne (Akne)

Fagron Advanced Derma Pack VNF

Vitamin A %0.4, Nikotinamid %5, Fitalite™

Rx		
A. Vitamin A		400 mg
B. Nikotinamid		5 g
C. Fitalite™	qs.	100 g

Endikasyon

Acne (idame tedavi)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Alopecia (Alopesi)

Fagron Advanced Derma Pack LS

Latanoprost %0.005, Seraqua™

Rx

Latanoprost Stok Solüsyonu

A. Latanoprost	0.005 g
B. Polisorbat 20	0.3 g
C. Fenoksietanol	0.05 g
D. Saf su	qs. 10 ml

Hazırlanması İstenilen Solüsyon

Latanoprost stok solüsyonu	1 ml
Seraqua™	qs. 10 ml

Endikasyon

Kaş ve kirpiklerin canlanması

Kullanım Şekli

Topikal. Serum, Fagron'un göz kapağı uygulayıcısıyla kaş üzerine ve kirpik dibine eşit miktarda uygulanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Fagron göz kapağı uygulayıcısında takdim edilir. Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ortamda, buzdolabında 2-8 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

120 gün (Latanoprost stok solüsyonu 3 ay boyunca oda sıcaklığında, 15-25 °C'de stabildir.)

Önerilen Doz

Günde 1 defa



Alopecia (Alopesi)

Fagron Advanced Derma Pack MCT

Minoksidil %5, Klobetazol propiyonat %0.05, TrichoFoam™

Rx

A. Minoksidil	2.5 g
B. Klobetazol propiyonat	25 mg
C. TrichoFoam™	qs. 50 ml

Endikasyon

Alopecia (Alopesi)

Kullanım Şekli

Topikal. Köpük kuru kafa derisine masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Fagron köpükleştirici şişe ile takdim edilir. Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ortamda, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

24 saatte 2 köpük dozu



Alopecia (Alopesi)

Fagron Advanced Derma Pack MET-A

Minoksidil %5, 17 α -estradiol %0.05, TrichoFoam™

Rx

A. Minoksidil		2.5 g
B. 17 α -estradiol		25 mg
C. TrichoFoam™	qs.	50 ml

Endikasyon

Alopecia (Alopesi)

Kullanım Şekli

Topikal. Köpük kuru kafa derisine masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Fagron köpükleştirici şişe ile takdim edilir. Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ortamda, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

24 saatte 2 köpük dozu



Alopecia (Alopesi)

Fagron Advanced Derma Pack MFT

Minoksidil %5, Finasterid %0.1, TrichoFoam™

Rx

A. Minoksidil		2.5 g
B. Finasterid		50 mg
C. TrichoFoam™	qs.	50 ml

Endikasyon

Alopecia (Alopesi)

Kullanım Şekli

Topikal. Köpük kuru kafa derisine masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Fagron köpükleştirici şişe ile takdim edilir. Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ortamda, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

24 saatte 2 köpük dozu



Alopecia (Alopesi)

Fagron Advanced Derma Pack Dual MLT*

Minoksidil %5, Latanoprost %0.005, TrichoFoam™

Rx		
A. Minoksidil		2.5 g
B. Latanoprost		2.5 mg
C. TrichoFoam™	qs.	50 ml

Endikasyon

Alopecia (Alopesi)

Kullanım Şekli

Topikal. Köpük kuru kafa derisine masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Fagron köpükleştirici şişe ile takdim edilir. Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ortamda, buzdolabında 2-8 °C'de saklayınız. Dondurmayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

24 saatte 2 köpük dozu

* Pakette 2 x 50 ml'lik iki tane solüsyon hazırlamak için gerekli içerik bulunmaktadır.



Alopecia (Alopesi)

Fagron Advanced Derma Pack MTE

Minoksidil %5, Tretinoin (Retinoik asit) %0.05, Espumil™

Rx

A. Minoksidil	2.5 g
B. Tretinoin (Retinoik asit)	25 mg
C. Espumil™ qs.	50 ml

Endikasyon

Alopecia (Alopesi)

Kullanım Şekli

Topikal. Köpük kuru kafa derisine masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Fagron köpükleştirici şişe ile takdim edilir. Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ortamda, buzdolabında 2-8 °C'de saklayınız. Dondurmayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

90 gün

Önerilen Doz

24 saatte 2 köpük dozu



Alopecia (Alopesi)

Fagron Advanced Derma Pack PPE

Prostaquinon™ %3, Espumil™

Rx

A. Prostaquinon™	1.5 g
B. PEG-40 hidrojenlenmiş hint yağı	6 g
C. Espumil™	50 ml
qs.	

Endikasyon

Alopecia (Alopesi)

Kullanım Şekli

Topikal. Köpük kuru kafa derisine masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Fagron köpükleştirici şişe ile takdim edilir. Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ortamda, buzdolabında 2-8 °C'de saklayınız. Dondurmayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

90 gün

Önerilen Doz

24 saatte 2 köpük dozu



Antiaging (Yaşlanma önleyici)

Fagron Advanced Derma Pack ANAN

**Arjinin HCl %2.5, Nikotinamid %4,
Askorbik asit %10, Nourivan™ Antiox**

Rx

A. Arjinin HCl	1.25 g
B. Nikotinamid	2 g
C. Askorbik asit	5 g
D. Nourivan™ Antiox	qs. 50 g

Endikasyon

Antiaging (Yaşlanma önleyici) (Birinci derece)*

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı, airless ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa

*Birinci derece: İnce çizgi ve kırışıklıkların azalması

*İkinci derece: Derin kırışıklıkların azalması



Antiaging (Yaşlanma önleyici)

Fagron Advanced Derma Pack CNAN

**Siyanokobalamin %0.07, Nikotinamid %4,
Askorbik asit %10, Nourivan™ Antiox**

Rx	
A. Siyanokobalamin	35 mg
B. Nikotinamid	2 g
C. Askorbik asit	5 g
D. Nourivan™ Antiox	qs. 50 g

Endikasyon

Antiaging (Yaşlanma önleyici) (İkinci derece)*

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı, airless ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa

*Birinci derece: İnce çizgi ve kırışıklıkların azalması

*İkinci derece: Derin kırışıklıkların azalması



Antiaging (Yaşlanma önleyici)

Fagron Advanced Derma Pack RS

Retinol (vit. A) %0.4, Seraqua™

Rx

A. Retinol (vit. A)

400 mg

B. Seraqua™ qs.

100 ml

Endikasyon

Antiaging (Yaşlanma önleyici) (İkinci derece)*

Kullanım Şekli

Topikal. Serum kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı, airless ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

60 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa (gece)

*Birinci derece: İnce çizgi ve kırışıklıkların azalması

*İkinci derece: Derin kırışıklıkların azalması



Antiaging (Yaşlanma önleyici)

Fagron Advanced Derma Pack SES

**Sodyum hiyalüronat %1,
EPIfactor® 1 ml, Seraqua™**

Rx		
A. Sodyum hiyalüronat		300 mg
B. EPIfactor®		1 ml
C. Seraqua™	qs.	30 ml

Endikasyon

Antiaging (Yaşlanma önleyici)
(Birinci ve ikinci derece)*

Kullanım Şekli

Topikal. Serum kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı, airless ambalajında, buzdolabında 2-8 °C'de saklayınız. Dondurmayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa

*Birinci derece: İnce çizgi ve kırışıklıkların azalması

*İkinci derece: Derin kırışıklıkların azalması



Atopic dermatitis/Eczema (Atopik dermatit/Egzema)

Fagron Advanced Derma Pack HYDROCAV

**Hidrokortizon asetat %1, Dekspantenol %5,
Siyanokobalamin %0.07, Arjinin HCl %2.5,
Versatile™ Rich**

Rx

A. Hidrokortizon asetat	1 g
B. Dekspantenol	5 g
C. Siyanokobalamin	70 mg
D. Arjinin HCl	2.5 g
E. Versatile™ Rich	qs. 100 g

Endikasyon

Atopic dermatitis/Eczema
(Atopik dermatit/Egzema)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Bed sores (Yatak yarası)

Fagron Convenience Derma Pack PL

Pentoksifilin %5, Lavare™

Rx

A. Pentoksifilin

2.5 g

B. Lavare™

qs.

50 g

Endikasyon

Bed sores (Yatak yarası)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Bed sores (Yatak yarası)

Fagron Advanced Derma Pack PMV

Pentoksifilin %5, Metronidazol %2, Versatile™

Rx

A. Pentoksifilin		5 g
B. Metronidazol		2 g
C. Versatile™	qs.	100 g

Endikasyon

Bed sores (Yatak yarası)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Hemangiomas (Hemanjiyom)

Fagron Advanced Derma Pack PROP

Propranolol HCl %1, Pentravan®

Rx

A. Propranolol HCl	500 mg
B. Pentravan®	qs. 50 g

Endikasyon

Hemangiomas (Hemanjiyom)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Hemorrhoids (Hemoroid)

Fagron Advanced Derma Pack NLP

Nifedipin %0.3, Lidokain %1, Pentruvan®

Rx		
A. Nifedipin		300 mg
B. Lidokain		1 g
C. Pentruvan®	qs.	100 g

Endikasyon

Hemorrhoids (Hemoroid)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Hyperhidrosis (Hiperhidroz)

Fagron Advanced Derma Pack GBF

Glikopironyum bromür %2, Fitalite™

Rx

A. Glikopironyum bromür 500 mg
B. Fitalite™ qs. 25 g

Endikasyon

Hyperhidrosis (Hiperhidroz)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa



Hyperkeratosis (Hiperkeratoz)

Fagron Advanced Derma Pack 5-FV

5-Fluorourasil %5, Versatile™

Rx

A. 5-Fluorourasil

5 g

B. Versatile™

qs.

100 g

Endikasyon

Actinic keratosis (Aktinik keratoz)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır.

Not: Majistral ilaç deriye tatbik edilirken, eldiven takmak ve diğer tüm antineoplastik önlemleri mutlaka uygulamak gerekmektedir.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa



Hyperkeratosis (Hiperkeratoz)

Fagron Advanced Derma Pack SAVU

Salisilik asit %3, Amonyum laktat %10, Üre %15, Versatile™ Rich

Rx

A. Salisilik asit	3 g
B. Amonyum laktat	10 g
C. Üre	15 g
D. Versatile™ Rich	qs. 100 g

Endikasyon

Hyperkeratosis (Hiperkeratoz)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Hyperpigmentation (Hiperpigmentasyon)

Fagron Advanced Derma Pack ACA

**Arbutin %5, Askorbik asit %1.5,
Nourivan™ Antiox**

Rx

A. Arbutin		5 g
B. Askorbik asit		1.5 g
C. Nourivan™ Antiox	qs.	100 g

Endikasyon

Hyperpigmentation (Hiperpigmentasyon)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa



Hyperpigmentation (Hiperpigmentasyon)

Fagron Advanced Derma Pack HTTN

**Hidrokinon %5, Tretinoin (Retinoik asit) %0.05,
Triamsinolon asetonid %0.01,
Nourivan™ Antiox**

Rx

A. Hidrokinon	5 g
B. Tretinoin (Retinoik asit)	50 mg
C. Triamsinolon asetonid	10 mg
D. Nourivan™ Antiox	qs. 100 g

Endikasyon

Hyperpigmentation (Hiperpigmentasyon)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa



Mycosis feet (Ayak mantarı)

Fagron Advanced Derma Pack MVZ

**Mikonazol %2, Hint yağı %5, Peru balsamı %5,
Çinko oksit %10, Versatile™ Rich**

Rx	
A. Mikonazol	2 g
B. Hint yağı	5 g
C. Peru balsamı	5 g
D. Çinko oksit	10 g
E. Versatile™ Rich	qs. 100 g

Endikasyon

Mycosis feet (Ayak mantarı)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Nail treatment (Tırnak tedavisi)

Fagron Convenience Pack CSU

Klobetazol propiyonat %8, Salisilik asit %4, Unabase®

Rx

A. Klobetazol propiyonat 800 mg
B. Salisilik asit 400 mg
C. Unabase® qs. 10 ml

Endikasyon

Nail treatment (Tırnak tedavisi)

Kullanım Şekli

Topikal. Solüsyon tırnak yüzeyine eşit miktarda uygulanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Fırça ihtiva eden ambalajında takdim edilir. Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ortamda, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

İlk hafta her gün 1 defa, sonrasında haftada 2 veya 3 defa



Onychomycosis (Ayak tırnağı mantarı)

Fagron Convenience Pack CLU

Klotrimazol %6, Unabase®

Rx

A. Klotrimazol		600 mg
B. Unabase®	qs.	10 ml

Endikasyon

Onychomycosis (Ayak tırnağı mantarı)

Kullanım Şekli

Topikal. Solüsyon tırnak yüzeyine eşit miktarda uygulanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Fırça ihtiva eden ambalajında takdim edilir. Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ortamda, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

İlk hafta her gün 1 defa, sonrasında haftada 2 veya 3 defa



Onychomycosis (Ayak tırnağı mantarı)

Fagron Convenience Pack MR

Mikonazol %10, Recura™

Rx

A. Mikonazol

5 g

B. Recura™

qs.

50 g

Endikasyon

Onychomycosis (Ayak tırnağı mantarı)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem tırnak yüzeyine eşit miktarda uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

180 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Oral lichen (Oral liken planus)

Fagron Advanced Derma Pack CO

Klobetazol propiyonat %0.05, Orafix®

Rx

A. Klobetazol propiyonat	25 mg
B. Orafix®	qs. 50 g

Endikasyon

Oral lichen (Oral liken planus)

Kullanım Şekli

Topikal. Jel zarar görmüş alana uygulanır.

Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa. Bir şey yiyip içmeden önce kullanılması uygundur.



Oral lichen (Oral liken planus)

Fagron Convenience Pack T0

Takrolimus monohidrat %0.1, Orafix®

Rx

A. Takrolimus monohidrat 50 mg

B. Orafix® qs. 50 g

Endikasyon

Oral lichen (Oral liken planus)

Kullanım Şekli

Topikal. Jel zarar görmüş alana uygulanır.

Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, buzdolabında 2-8°C'de saklayınız. Dondurmayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa. Bir şey yiyip içmeden önce kullanılması uygun değildir.



Post laser (Lazer sonrası)

Fagron Advanced Derma Pack EPV

EPIfactor® 1 ml, Versatile™ Rich

Rx

A. EPIfactor®

1 ml

B. Versatile™ Rich

qs.

30 g

Endikasyon

Post laser (Lazer sonrası)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Lazer sonrası



Postherpetic neuralgia (Postherpetik nevralji)

Fagron Convenience Pack GKALP

**Gabapentin %10, Ketoprofen %5,
Amitriptilin HCl %2, Lidokain HCl %5,
Pentruvan®**

Rx	
A. Gabapentin	10 g
B. Ketoprofen	5 g
C. Amitriptilin HCl	2 g
D. Lidokain HCl	5 g
E. Pentruvan®	qs. 100 g

Endikasyon

Postherpetic neuralgia (Postherpetik nevralji)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, buzdolabında 2-8 °C'de saklayınız. Dondurmayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa



Postherpetic neuralgia (Postherpetik nevralji)

Fagron Convenience Pack KLP

Ketoprofen %10, Lidokain HCl %5, Pentruvan®

Rx	
A. Ketoprofen	10 g
B. Lidokain HCl	5 g
C. Pentruvan®	qs. 100 g

Endikasyon

Postherpetic neuralgia (Postherpetik nevralji)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa



Psoriasis (Sedef hastalığı)

Fagron Advanced Derma Pack DCN

Ditranol %1, Kömür katranı çözeltisi %1, Nourivan™ Antiox

Rx

A. Ditranol		1 g
B. Kömür katranı çözeltisi		1 g
C. Nourivan™ Antiox	qs.	100 g

Endikasyon

Psoriasis (Sedef hastalığı -
Birinci basamak tedavi)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Majistral ilacı deriye tatbik ederken tek kullanımlık eldiven kullanınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa



Psoriasis (Sedef hastalığı)

Fagron Advanced Derma Pack CZV

Kömür katranı çözeltisi %5, Çinko oksit %5, Versatile™ Rich

Rx

A. Kömür katranı çözeltisi	5 g
B. Çinko oksit	5 g
C. Versatile™ Rich	qs. 100 g

Endikasyon

Psoriasis (Sedef hastalığı - iyileşme süreci)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Majistral ilacı deriye tatbik ederken tek kullanımlık eldiven kullanınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2-4 defa (Fotokemoterapi tedavi süresince ilgili işlemden iki saat önce uygulanır)



Psoriasis (Sedef hastalığı)

Fagron Advanced Derma Pack SRNAV

**Şi ağacı yağı %10, Kuşburnu yağı %5,
Nikotinamid %2, Alfa-tokoferol (E vitamini) %3,
Versatile™**

Rx

A. Şi ağacı yağı	10 g
B. Kuşburnu yağı	5 g
C. Nikotinamid	2 g
D. Alfa-tokoferol	3 g
E. Versatile™	qs. 100 g

Endikasyon

Psoriasis (Sedef hastalığı - önceki CZV ve DNC paketleri ile kombine tedavi)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Rosace (Gül hastalığı)

Fagron Advanced Derma Pack IF

İvermektin %1, Fitalite™

Rx		
A. İvermektin		1 g
B. Fitalite™	qs.	100 g

Endikasyon

Rosacea (Gül hastalığı)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 1 defa



Rosace (Gül hastalığı)

Fagron Advanced Derma Pack PEF

Permetrin %5, Fitalite™

Rx

A. Permetrin

5 g

B. Fitalite™

qs.

100 g

Endikasyon

Rosacea (Gül hastalığı)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Seborrheic dermatitis (Seborrheic dermatit)

Fagron Advanced Derma Pack TT

Takrolimus monohidrat %0.1, TrichoSol™

Rx

A. Takrolimus monohidrat	100 mg
B. TrichoSol™	qs. 100 ml

Endikasyon

Seborrheic dermatitis (Seboreik dermatit)

Kullanım Şekli

Topikal. Solüsyon kafa derisine masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Spreyleştirici şişesinde takdim edilir. Hava geçirmez, ışıktan korumalı ortamda, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

90 gün

Önerilen Doz

24 saatte 1 defa 3-5 sprey dozu



Spider veins/Bruises (Örümcek damar/Morarma)

Fagron Advanced Derma Pack HF

Heparin sodyum %1, Fitalite™

Rx

A. Heparin sodyum		500 mg
B. Fitalite™	qs.	50 g

Endikasyon

Spider veins/ Bruises
(Örümcek damar/Morarma)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirilmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Stretch marks (Deri çatlağı)

Fagron Advanced Derma Pack ACN

**Argan yağı %15, Hint yağı %2,
Nourivan™ Antiox**

Rx

A. Argan yağı		15 g
B. Hint yağı		2 g
C. Nourivan™ Antiox	qs.	100 g

Endikasyon

Stretch marks (Deri çatlağı)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Günde 2 defa



Topical anesthesia (Topikal anestezi)

Fagron Advanced Derma Pack BLTV

**Mikronize benzokain %20, Lidokain %6,
Tetrakain %4, Versatile™**

Rx		
A. Mikronize benzokain		10 g
B. Lidokain		3 g
C. Tetrakain		2 g
D. Versatile™	qs.	50 g

Endikasyon

Topical anesthesia (Topikal anestezi)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.


Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Her 4x4 cm'lik uygulama alanına, parmak ucuyla alacağınız krem 0,5 cm kalınlıkta olacak şekilde uygulanır.

¹ Topikal majistral anestetikler güvenli ürünlerdir ancak uyarılara uymadan kullanılması durumunda ciddi zarar verme potansiyelleri vardır. Belirli anatomik bölgeye, bu bölgenin tüm yüzeyinin kaplandığına ve bu bölgeye ürünün temas süresine dikkat edilmelidir. Topikal majistral anestetiklerin bir uzman tarafından uygulanması gerekmektedir.



Topical anesthesia (Topikal anestezi)

Fagron Advanced Derma Pack LTV

Lidokain %7, Tetrakain %7, Versatile™

Rx		
A. Lidokain		3.5 g
B. Tetrakain		3.5 g
C. Versatile™	qs.	50 g

Endikasyon

Topical anesthesia (Topikal anestezi)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Her 4x4 cm'lik uygulama alanına, parmak ucuyla alacağınız krem 0,5 cm kalınlıkta olacak şekilde uygulanır.

¹ Topikal majistral anestetikler güvenli ürünlerdir ancak uyarılara uymadan kullanılması durumunda ciddi zarar verme potansiyelleri vardır. Belirli anatomik bölgeye, bu bölgenin tüm yüzeyinin kaplandığına ve bu bölgeye ürünün temas süresine dikkat edilmelidir. Topikal majistral anestetiklerin bir uzman tarafından uygulanması gerekmektedir.



Xerosis (Kserozis)

Fagron Advanced Derma Pack SANAV

**Sodyum hiyalüronat %1, Arjinin HCl %2.5,
Nikotinamid %4, Alfa-tokoferol (E vitamini) %5,
Versatile™**

Rx

A. Sodyum hiyalüronat	1 g
B. Arjinin HCl2.	5 g
C. Nikotinamid	4 g
D. Alfa-tokoferol	5 g
E. Versatile™	qs. 100 g

Endikasyon

Xerosis (Kserozis)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, buzdolabında 2-8 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

90 gün

Önerilen Doz

Sekiz saatte 1 defa



Xerosis (Kserozis)

Fagron Advanced Derma Pack UNAV

**Üre %20, Nikotinamid %2,
Alfa-tokoferol (E vitamini) %5, Versatile™**

Rx	
A. Üre	20 g
B. Nikotinamid	2 g
C. Alfa-tokoferol	5 g
D. Versatile™	qs. 100 g

Endikasyon

Xerosis (Kserozis)

Kullanım Şekli

Topikal. Krem kuru alana masaj yaparak uygulanır ve zarar görmüş alana penetrasyonu sağlanır.

Ambalaj ve Saklama Koşulları

Hava geçirmeyen, ışıktan korumalı ambalajında, 15-25 °C'de saklayınız.

Hazırlanmış Ürünün Kullanım Süresi

30 gün

Önerilen Doz

Sekiz saatte 1 defa




Referanslar

- A.G.Messenger, J. Rundegren. Minoxidil: mechanisms of action on hair growth. *British Journal of Dermatology* 2004; 150: 186–194.
- Aftab Ahmad et al. A review on therapeutic potential of *Nigella sativa*: Amira herb. *Asian Pac J Trop Biomed*. 2013; 3(5):337–352. Akhtar, N., Sharma, H., & Pathak, K. (2016). Onychomycosis: potential of nail lacquers in transungual delivery of antifungals. *Scientifica*, 2016. Alfredo Rossi et al. Evaluation of a Therapeutic Alternative for Telogen Effluvium: A Pilot Study. *Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications*. 2013; 3: 9–16.
- Alster TS. The lidocaine/tetracaine peel: a novel topical anesthetic for dermatologic procedures in adult patients. *Dermatol Surg*. 2007. *Am Acad Dermatol*. 1990 Feb;22(2 Pt 1):199–203.
- Evaluation of ammonium lactate in the treatment of seborrheic keratoses. Klaus MV1, Wehr RF, Rogers RS 3rd, Russell TJ, Krochmal L.
- An Update on Topical Therapies for Mild-Moderate Psoriasis. Peter C.M.vandeKerkhof, MD, PhD. Gerd M, Ljunghall K.
- Ann Dermatol Venereol*. 2012 Dec;139 Suppl 4:S153–8. doi: 10.1016/S0151-9638(12)70128-X.
- Topical treatment of hyperpigmentation disorders. Rendon M1, Horwitz S.
- Antonella Tosti, Matilde Iorizzo, Gian Luca Botta, Massimo Milani. Efficacy and safety of a new clobetasol propionate 0.05% foam in alopecia areata: a randomized, double-blind placebo-controlled trial. *JEADV* 2006, 20, 1243–1247.
- Aust Fam Physician*. 2016 May;45(5):293–6. Atopic dermatitis in children. Strathie Page S, Weston S, Loh R.
- B. S. Chandrashekar et al. Topical minoxidil fortified with finasteride: An account of maintenance of hair density after replacing oral finasteride. *Indian Dermatology Online Journal*. 2015 Jan-Feb; 6 (1): 17–20.
- Barbarino C. Pentoxifylline in the treatment of venous leg ulcers. *Curr Med Res Opin* 1991;12:547–551.
- Brenman SA. Pentoxifylline as adjunctive therapy in leg ulcer management. *J Am Osteopath Assoc* 1991;91:677–686.
- Bernstein, J. E., & Shalita, A. R. (1980). Topically applied erythromycin in inflammatory acne vulgaris. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 2(4), 318–321.
- Blume-Peytavi U, Lönnfors S, Hillmann K, Garcia Bartels N. A randomized double-blind placebo controlled pilot study to assess the efficacy of a 24-week topical treatment by latanoprost 0.1% on hair growth and pigmentation in healthy volunteers with androgenetic alopecia. *J Am Acad Dermatol*. 2012 May; 66(5):794–800.
- Brenman SA. Pentoxifylline as adjunctive therapy in leg ulcer management. *J Am Osteopath Assoc* 1991;91:677–686.
- Clin Cosmet Invest Dermatol*. 2011;4:79–92. doi: 10.2147/CCID.S13873.
- Epub 2011 Jul 1. Retinoid plus antimicrobial combination treatments for acne. Feneran AN1, Kaufman WS, Dabade TS, Feldman SR.
- Collins, L., & Seraj, S. (2010). Diagnosis and treatment of venous ulcers. *American family physician*, 81(8), 989.
- Comparison of topical 5% nicotinamid gel versus 2% clindamycin gel in the treatment of the mild-moderate acne vulgaris: A double-blinded randomized clinical trial. Zabiollah Shahmoradi, Farib Iraj, Amir Hossein Siadat, and Azamosadat Ghorbaini.
- Coronel-Pérez IM, Rodríguez-Rey EM, Camacho-Martínez FM. Latanoprost in the treatment of eyelash alopecia in alopecia areata universalis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2010 Apr;24(4):481–5.
- Corrocher, G., Di Lorenzo, G., Martinelli, N., Mansueto, P., Biasi, D., Nocini, P. F., ... & Gelio, S. (2008). Comparative effect of tacrolimus 0.1% ointment and clobetasol 0.05% ointment in patients with oral lichen planus. *Journal of clinical periodontology*, 35(3), 244–249.
- Depigmenting and bleaching agents: coping with hyperpigmentation. Katsambas AD1, Stratigos AJ. *Evid Based Dent*. 2016 Mar;17(1):16. doi: 10.1038/sj.ebd.6401150. Tacrolimus or clobetasol for treatment of oral lichen planus. Shipley CA1, Spivakovsky S2, Fatemeh Frouzanfar, Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz, Hossein Hosseinzadeh. Black cumini (*Nigella sativa*) and its constituent (thymoquinone): a review on antimicrobial effects. *Iran J Basic Med Sci*. 2014; 17: 929–938.
- Federici, A., Federici, G., & Milani, M. (2012). An urea, arginine and carnosine based cream (Ureadin Rx Db ISDIN) shows greater efficacy in the treatment of severe xerosis of the feet in Type 2 diabetic patients in comparison with glycerol-based emollient cream. A randomized, assessor-blinded, controlled trial. *BMC dermatology*, 12(1), 16.
- Forstinger, C., Kittler, H., & Binder, M. (1999). Treatment of rosacea-like demodicidosis with oral ivermectin and topical permethrin cream. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 41(5), 775–777.
- Fukayama, H., Suzuki, N., & Umino, M. (2002). Comparison of topical anesthesia of 20% benzocaine and 60% lidocaine gel. *Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology*, 94(2), 157–161.
- Gad, M. Z. (2010). Anti-aging effects of L-arginine. *Journal of Advanced Research*, 1(3), 169–177.
- Ganceviciene, R., Liakou, A. I., Theodoridis, A., Makrantonaki, E., & Zouboulis, C. C. (2012). Skin anti-aging strategies. *Dermato-endocrinology*, 4(3), 308–319.
- Garza LA, Liu Y, Yang Z, et al. Prostaglandin D2 inhibits hair growth and is elevated in bald scalp of men with androgenetic alopecia. *Sci Transl Med*. 2012 Mar 21;4(126):126ra34.
- Gautam, P., Light, B., & Purvis, T. (2017). Stability of Two Antifungal Agents, Fluconazole and Miconazole, Compounded in HUMCO RECURA Topical Cream to Determine Beyond-Use Date. *International journal of pharmaceutical compounding*, 21(2), 154–159.

- Goreja, W. G. (2004). Shea butter: the nourishing properties of Africa's bestkept natural beauty secret. TNC International Inc.
- Gupta, Shyam. "Ascorbic acid salts of organic bases with enhanced bioavailability for synergistic anti-aging and skin protective cosmetic compositions." U.S. Patent Application No. 10/265,000.
- Hickman JG, Jarratt MT, Stewart DM, Levy SF. The efficacy and safety of a combination benzoyl peroxide/clindamycin topical gel compared with benzoyl peroxide alone and a benzoyl peroxide/erythromycin combination product. *Leyden J11*.
- Hideo Uno, Michele L. Zimbric, Daniel M. Albert, Johan Stjerschantz. Effect of Latanoprost on Hair Growth in the Bald Scalp of the Stump-tailed Macaque: A Pilot Study. *Acta Derm Venereol* 2002; 82: 7–12.
- HUANG, S. C., LIN, C. C., HUANG, M. C., & WEN, K. C. (2004). Simultaneous determination of magnesium ascorbyl phosphate, ascorbyl glucoside, kojic acid, arbutin and hydroquinone in skin whitening cosmetics by HPLC. *Journal of Food and Drug Analysis*, 12(1).
- Hyo Seung Shin et al. Efficacy of 5% Minoxidil versus Combined 5% Minoxidil and 0.01% Tretinoin for Male Pattern Hair Loss. *Am J Clin Dermatol* 2007; 8 (5): 285–290.
- Iorizzo M1, Vincenzi C, Voudouris S, Piraccini BM, Tosti A. Finasteride treatment of female pattern hair. *Arch Dermatol*. 2006 Mar;142(3):298–302.
- Iran Red Crescent Med J. 2014 Aug;16(8):e13592. doi: 10.5812/ircmj.13592. Epub 2014 Aug 5. Comparison of topical nifedipine with oral nifedipine for treatment of anal fissure: a randomized controlled trial. *Golfam F1, Golfam P2, Golfam B3, Pahlevani P4*.
- J Drugs Dermatol. 2016 May 1;15(5):633–9. Urea: A Clinically Oriented Overview from Bench to Bedside. *Friedman AJ, von Grote EC, Meckfessel MH.J*.
- John S. May, MD, and W. Frederick McGuirt, MD. Frey's Syndrome: Treatment with topical glycopyrrolate. *January/February 1989. Hwad & Neck. 11:85–89.*
- Kocak, M., Yaglı, S., Vahapoğlu, G., & Ekşioglu, M. (2002). Permethrin 5% cream versus metronidazole 0.75% gel for the treatment of papulopustular rosacea. *Dermatology*, 205(3), 265–270.
- Kafi, R., Kwak, H. S. R., Schumacher, W. E., Cho, S., Hanft, V. N., Hamilton, T. A., ... & Voorhees, J. J. (2007). Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol). *Archives of dermatology*, 143(5), 606–612.
- Kohler C1, Tschumi K, Bodmer C, Schneiter M, Birkhaeuser M. Effect of finasteride 5 mg (Proscar) on acne and alopecia in female patients with normal serum levels of free. *Gynecol Endocrinol*. 2007 Mar;23(3):142–5.
- Kovačević, M., Lukinović Škudar, V., Maričić, G., Krnjević-Pezić, G., & Stanimirović, A. (2014). Topical propranolol cream in treatment of superficial infantile hemangiomas: a literature review and 4 years of clinical experience. *Acta Dermatovenereol Alp Pannonica Adriat*, 23, 75–78.
- Long-term Efficacy of Topical Fluorouracil Cream, 5%, for Treating Actinic Keratosis: A Randomized Clinical Trial.
- Lynde, C. W. (2001). Moisturizers: what they are and how they work. *Skin Therapy Lett*, 6(13), 3–5.
- M.Y. Hyun, I.P. Son, Y. Lee, H.G. Choi, K.Y. Park, K. Li, B.J. Kim, S.J. Seo, M.N. Kim, C.K. Hong. Efficacy and safety of topical glycopyrrolate in patients with facial hyperhidrosis: a randomized, multicentre, double-blinded, placebo-controlled, split-face study. *JEADV* 2015, 29:278–282.
- Management strategies for acne vulgaris. *Kristen M Whitney, Chérie M Ditte. Clin Cosmet Investig Dermatol*. 2011; 4: 41–53. Published online 2011 April 26. doi: 10.2147/CCID.S10817.
- Masaki, H. (2010). Role of antioxidants in the skin: anti-aging effects. *Journal of dermatological science*, 58(2), 85–90.
- Medicinal Plants for the Treatment of Acne Vulgaris: A Review of Recent Evidences. *Hamid Nasri,1 Mahmoud Bahmani,2 Najmeh Shahinfard,3 Atefeh Moradi Nafchi,4 Shirin Saberianpour,4 and Mahmoud Rafieian Kopaei,4,*.* Meshkinpour, A., Sun, J., & Weinstein, G. (2003). An open pilot study using tacrolimus ointment in the treatment of seborrheic dermatitis. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 49(1), 145–147.
- Messenger, J. Rundegren. Minoxidil: mechanisms of action on hair growth. *British Journal of Dermatology* 2004; 150: 186–194.
- Mills Jr, O. H., Kligman, A. M., Pochi, P., & Comite, H. (1986). Comparing 2.5%, 5%, and 10% benzoyl peroxide on inflammatory acne vulgaris. *International journal of dermatology*, 25(10), 664–667.
- Murray A. Johnstone, MD, Daniel M. Albert, MD, MS. Prostaglandin-Induced Hair Growth. *Surv Ophthalmol* 47(Suppl 1):S185–S202, 2002. Elsevier Science Inc. August 2002.
- Oh Sang Kwon et al. Promotive Effect of Minoxidil Combined with All-trans Retinoic Acid (tretinoin) on Human Hair Growth in Vitro. *J Korean Med Sci* 2007; 22: 283–9.
- Oliveira-Soares R et al. Finasteride 5 mg/day Treatment of Patterned Hair Loss in Normoandrogenetic Postmenopausal Women. *Int J Trichology*. 2013 Jan;5(1):22–5. Oster, G., Harding, G., Dukes, E., Edelsberg, J., & Cleary, P. D. (2005). Pain, medication use, and health-related quality of life in older persons with postherpetic neuralgia: results from a population-based survey. *The Journal of pain*, 6(6), 356–363.
- Otte, N., Borelli, C., & Korting, H. C. (2005). Nicotinamide—biologic actions of an emerging cosmetic ingredient. *International journal of cosmetic science*, 27(5), 255–261.
- Over-the-counter Acne Treatments A Review. *Ashley Decker, BS, MA* corresponding author and *Emily M. Graber, MD*.
- Oyeka, C. A., & Gughani, H. C. (1992). Isoconazole nitrate versus clotrimazole in foot and nail infections due to *Hendersonula toruloides*, *Scytalidium hyalinum* and dermatophytes: Isoconazole Nitrate versus Clotrimazole bei Fuß- und Nagelinfektionen durch *Hendersonula toruloides*, *Scytalidium hyalinum* und Dermatophyten. *Mycoses*, 35(11–12), 357–361.
- Panin, G., Strumia, R., & Ursini, F. (2004). Topical α -Tocopherol Acetate in the Bulk Phase: Eight Years of Experience in Skin Treatment. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1031(1), 443–447.
- Patients with dermatitis herpetiformis, acne, psoriasis, and Darier's disease have low epidermal zinc concentration. *Ada Derm. Venereol* 1990; 70: 304–8. Pomerantz H, Hogan D, Eilers D, Swetter SM, Chen SC, Jacob SE, Warshaw EM, Stricklin G, Dellavalle RP, Sidhu-Malik N, Konnikov N, Werth VP, Kerl J, Lew R, Weinstein MA; Veterans Affairs Keratinocyte

- Carcinoma Chemoprevention (VAKCC) Trial Group. Purvis, T. (2015). Simultaneous High Performance Liquid Chromatography Assay of Pentoxifylline, Mupirocin, Itraconazole, and Fluticasone Propionate in Humco™ Lavare Wound Base. *Chromatography*, 2(4), 642-654.
- Raedler, L. A. (2015). Soolantra (Ivermectin) 1% cream: a novel, antibiotic-free agent approved for the treatment of patients with rosacea. *American health & drug benefits*, 8(Spec Feature), 122. Rezaabek GH, Friedman AD. Superficial fungal infections of the skin. Diagnosis and current treatment recommendations. *Drugs*. 43(5); 1992:674-682.
- Rossi A, Priolo L, Iorio A, et al. Evaluation of a therapeutic alternative for telogen effluvium: a pilot study. *J Cosmet Dermatol Sci Appl*. 2013 August;3(3A):9-16.
- Rowbotham, M., Harden, N., Stacey, B., Bernstein, P., Magnus-Miller, L., & Gabapentin Postherpetic Neuralgia Study Group. (1998). Gabapentin for the treatment of postherpetic neuralgia: a randomized controlled trial. *Jama*, 280(21), 1837-1842.
- S. Sasaki, Y. Hozumi, S. Kondo. Influence of prostaglandin F2a and its analogues on hair regrowth and follicular melanogenesis in a murine model. *Experimental Dermatology* 2005; 14: 323-328.
- Sánchez Regaña, M., Martín Ezquerro, G., Umbert Millet, P., & Llambí Mateos, F. (2005). Treatment of nail psoriasis with 8% clobetasol nail lacquer: positive experience in 10 patients. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 19(5), 573-577.
- Shin, H., Kwon, O. S., Won, C. H., Kim, B. J., Lee, Y. W., Choe, Y. B., ... & Eun, H. C. (2009). Clinical efficacies of topical agents for the treatment of seborrheic dermatitis of the scalp: a comparative study. *The Journal of dermatology*, 36(3), 131-137.
- Skin Res Technol. 1995 Aug;1(3):115-22. doi: 10.1111/j.1600-0846.1995.tb00030.x. Mechanism of action of a lipophilic derivative of salicylic acid on normal skin. Lévêque JL1, Corcuff P1, Gonnord G1, Montastier C1, Renault B1, Bazin R1, Piérard G1, Poelman MC1.
- Smith, K. C., & Melnychuk, M. (2005). Five percent lidocaine cream applied simultaneously to the skin and mucosa of the lips creates excellent anesthesia for filler injections. *Dermatologic surgery*, 31, 1635-1637.
- Sparavigna, A., Tenconi, B., & De Ponti, I. (2015). Antiaging, photoprotective, and brightening activity in biorevitalization: a new solution for aging skin. *Clinical, cosmetic and investigational dermatology*, 8, 57.
- Stout SM, Stumpf JL. Finasteride treatment of hair loss in women. *Ann Pharmacother*. 2010 Jun;44(6):1090-7.
- Stussi, I. S. A. B. E. L. L. E., Henry, F. L. O. R. E. N. C. E., Moser, P. H. I. L. I. P. E. E., Danoux, L. O. U. I. S., Jeanmaire, C., Gillon, V., ... & Pauly, G. I. L. L. E. S. (2005). *Argania spinosa*-. How ecological farming, fair trade and sustainability can drive the research for new cosmetic active ingredients. *Söfw-Journal*, 131, 46-58.
- Sudip Das, R C Ghorami, T Chatterjee, Gautam Banerjee. Comparative assessment of topical steroids, topical tretinoin (0.05%) and dithranol paste in alopecia areata. *Indian J Dermatol*. 2010 Apr-Jun; 55(2): 148-149.
- Topical drugs.In: Gennaro JR,ed Remington: The science and practice of Pharmacy.21st ed. Baltimore,MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2006:1288.
- Topically Applied Heparins for the Treatment of Vascular Disorders. A Comprehensive Review. Cesare Vecchio1 and Anna Frisinghelli2.
- Tosti, A., Piraccini, B. M., Cameli, N., Kokely, F., Plozzer, C., Cannata, G. E., & Benelli, C. (1998). Calcipotriol ointment in nail psoriasis: a controlled doubleblind comparison with betamethasone dipropionate and salicylic acid. *The British journal of dermatology*, 139(4), 655-659.
- Tran, D., Townley, J. P., Barnes, T. M., & Greive, K. A. (2015). An antiaging skin care system containing alpha hydroxy acids and vitamins improves the biomechanical parameters of facial skin. *Clinical, cosmetic and investigational dermatology*, 8, 9.
- Trüeb RM1; Swiss Trichology Study Group. Group. Finasteride treatment of patterned hair loss in normoandrogenic postmenopausal women. *Dermatology*. 2004;209(3):202-7.
- Ulrike Blume-Peytavi et al. Comparison of the efficacy and safety of topical minoxidil and topical alfatradil in the treatment of androgenetic alopecia in women. *Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft*. 2007; 5:1-7. United States Pharmacopeia, USP on compounding: A Guide for the Compounding Practitioner. United States Pharmacopeial Convention, Rockville MD USA; 2012.
- Valente Duarte de Sousa IC1, Tosti A. New investigational drugs for androgenetic alopecia. *Expert Opin Investig Drugs*. 2013 May;22(5):573-89.
- Walters, K. A., Flynn, G. L., & Marvel, J. R. (1985). Penetration of the human nail plate: the effects of vehicle pH on the permeation of miconazole. *Journal of pharmacy and pharmacology*, 37(7), 498-499.
- Wohlrab, Wolfgang, and Katrin Wellner. "Nail lacquer for the treatment of onychomycosis." U.S. Patent No. 5,346,692. 13 Sep. 1994.
- Won-Oak Kim et al. Treatment of Compensatory Gustatory Hyperhidrosis with Topical Glycopyrrolate. 2013. *Yonsei Medical L Journal*. 44(4):579-582.
- Worret, W. I., & Fluhr, J. W. (2006). Acne therapy with topical benzoyl peroxide, antibiotics and azelaic acid. *JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft*, 4(4), 293-300.
- Zaenglein, A. L., Pathy, A. L., Schlosser, B. J., Alikhan, A., Baldwin, H. E., Berson, D. S., ... & Keri, J. E. (2016). Guidelines of care for the management of acne vulgaris. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 74(5), 945-973.
- Zhao T, Blatt HB, Stanton DC, Carrasco L, Ahluwalia G, Fischer SM, FitzGerald GA, Cotsarelis G. Prostaglandin D2 inhibits hair growth and is elevated in bald scalp of men with androgenetic alopecia. *Sci Transl Med*. 2012 Mar 21;4(126):126ra34. [No author listed.] Management of smelly tumours [editorial]. *Lancet* 1990;335:141-142.





İTOB OSB Mah. 10007 Sk. No:3
Menderes / İzmir - TR

Telefon : 0232 265 40 04
E-Mail : info@galenikecza.com.tr

galenikecza.com.tr |   /galenikecza



 WhatsApp Sipariş
+90 533 275 22 16

 Destek Hattı
0.232 265 4 000